

Diagnose

13699.06 B **17 mm im DM haltendes, invasives, nieder differenziertes Karzinom, pT1c, G3, NO (0/11), begleitet durch kleine Zonen eines duktales Carcinoma in situ (max. DM 2 mm), pTis, G2, mдssig differenziert, VNPI 3 in einer proliferativen Form der fibrozystischen Mastopathie der linken Mamma. Exzizat zur SS-Untersuchung. Exzision im Gesunden.**

Kommentar

13699.06 B Unter der Mitberьcksichtigung des Nachresektates 13716.06 ist die Exzision dieses invasiven Mammakarzinoms mit kleinen Zonen eines duktales Carcinoma in situ einwandfrei mit dem regelkonformen Abstand im Gesunden erfolgt. Es liegt ein nieder differenziertes Karzinom, welches ohne immunhistochemische Reaktionen nur schwerlich zuzuordnen ist, vor. Differentialdiagnostisch kommt hier sowohl ein nieder differenziertes, duktales Mammakarzinom als auch ein lobulдres Mammakarzinom in Betracht. In dieser Situation werden wir die E-Cadherin-Reaktion durchfьhren. Der Zusatzbericht folgt nach. Wir werden auch noch die fьr das Mammakarzinom nцtigen immunhistochemischen Reaktionen veranlassen.

Mit freundlichen Grьssen

Dr. med. Irena T. Baltisser

